



Richtige Anwendung von Atropin 0,01% Augentropfen (unkonservierte Augentropfen)

Allgemeine Hinweise

- Bitte die Hinweise auf dem Etikett der Flasche zu Lagerung und Anwendung beachten
- Unerwünschte Wirkungen können sein: Pupillenerweiterung, erhöhte Lichtempfindlichkeit, kurzfristiges verschwommenes Sehen. Darum müssen die Tropfen abends angewendet werden. Vorsicht bei der Teilnahme am Straßenverkehr (Fahrradfahren).
- Für andere Kinder unzugänglich aufbewahren! Getrunken können die Tropfen giftig wirken

Dosierung

- 1x täglich direkt vor dem Schlafengehen, jeweils 1 Tropfen in die betroffenen Augen geben.

Anwendung

- Kontaktlinsen vor der Anwendung der Tropfen herausnehmen und erst 15 Min. nach dem Tropfen wieder ein.
- Den Kopf leicht in den Nacken legen und den Blick nach oben richten.
- Das untere Augenlid sanft nach unten ziehen und mit leichtem Druck auf die Flasche einen Tropfen auslösen.
- Möglichst dicht am Auge und äußeren Lidrand tropfen, ohne das Auge mit der Flasche zu berühren.
- Sollten wiederholt Tropfen entnommen werden müssen, z. B. weil welche danebengegangen sind, bitte kurz abwarten, bis die gequetschte Flasche komplett in ihre Ausgangsform zurückgekehrt ist.
- Um den Tropfen zu verteilen, die Augen für ca. 1 Minute schließen (nicht kneifen) und die Augäpfel leicht rollen. Gleichzeitig mit der Fingerspitze leicht auf den Augeninnenwinkel drücken.
- Nach der Anwendung eventuelle Flüssigkeitsreste vom Ventil abschütteln und die Flasche gründlich verschließen.

**Wir nehmen uns gerne Zeit für Sie und
beantworten Ihre Fragen!**